

Réussir la culture des oignons

Les différents types d'oignons



En plants racinés, il y a des oignons blancs et des oignons rouges. Les oignons jaunes sont commercialisés sous forme de bulbilles.

Plantation

Les plants d'oignons se plantent soit au printemps pour une récolte l'été suivant, soit à l'automne pour une récolte au printemps de l'année suivante

> Espacement



10 cm entre les plants

25 cm entre les lignes

Calendrier de culture

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Période de plantation



Période de récolte

Conduite de la culture



L'oignon craint les températures inférieures à -10 °C.

Arroser régulièrement en début de culture.

Les ennemis

Attention en particulier au **mildiou**, capable de dessécher totalement une culture en 2 - 3 semaines.

Ces attaques sont classiques sur oignons de couleur, en juillet, environ 20 jours après des passages pluvieux de plusieurs jours. La protection doit être effectuée très rapidement derrière ces périodes très humides pour faire obstacle à la germination des spores. Attention, lorsque la maladie apparaît, il est trop tard !

Botrytis squamosa est l'agent responsable du dessèchement des pointes des feuilles et de taches blanches, souvent sur oignons blancs. Le principal ravageur des oignons est la **mouche** contre laquelle, en secteurs sensibles, il convient de traiter le sol avec des granulés au moment de la plantation.

On utilisera exclusivement des produits avec la mention "autorisé dans les jardins".

Principaux symptômes



Attaque avancée de mildiou sur oignon



Botrytis sur feuille